


Documentos


Encuesta sobre tratamiento del hipertiroidismo en pacientes pediátricos

Inquiry about hyperthyroidism in children

Durante las semanas previas al XX Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes se envió por correo electrónico una encuesta con 10 preguntas a socios de SOCHED y de la Rama de Pediatría de la Sociedad Chilena de Pediatría. Fue contestada en forma voluntaria y anónima por médicos que trabajan en endocrinología pediátrica. El resultado de esta encuesta, con la opinión de 26 médicos, fue remitido al Dr. Scott Rivkees a quien se solicitó contestar las mismas preguntas y realizar un breve comentario de cada una de ellas (ver entrevista al Dr. Scott Rivkees en página 57).




Pregunta 1:
En su hospital, ¿Cuál es el tratamiento de elección para el hipertiroidismo?




Pregunta 2:
¿Cuándo fue la última vez que indicó PTU?


Documentos




Pregunta 3:
¿Cuál es el hecho adverso más grave que ha observado con PTU?



Pregunta 4:
Una niña pre-puberal tiene una reacción adversa relacionada al PTU o a metimazol. Entonces, ¿cuál sería su primera opción terapéutica?




Pregunta 5:
En un adolescente con enfermedad de Basedow Graves, ¿cuál es su primera opción de tratamiento?




Pregunta 6:
En una niña puberal con oftalmopatía tiroidea grave, pero no activa durante los últimos 3 meses presenta un evento adverso a PTU. ¿Cuál sería su sugerencia?


Documentos




Pregunta 7:
 Entre suprimir la producción de hormonas tiroideas con metimazol y agregando levotiroxina (bloqueo y reemplazo), o aumentar o disminuir la dosis de metimazol en base a la concentración de hormonas tiroideas, ¿qué opción prefiere?



Pregunta 8:
 ¿En qué pacientes sugiere realizar una ecotomografía tiroidea?



Pregunta 9:
 En un paciente pediátrico con un nódulo tiroideo. ¿Cuál es la característica más importante para sospechar la presencia de cáncer de tiroides?



Pregunta 10:
 Un paciente con cáncer de tiroides con metástasis pulmonares difusas es tratado con tiroidectomía total y 150 mCi de I¹³¹. Después de un año de estar libre de enfermedad la tiroglobulina estimulada con TSH fue indetectable y la ecotomografía cervical mostró un nódulo en el lecho tiroidea. En su opinión, ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento?